



BoerenNatuurdag 17 maart 2023

- Thema: inzet van vrijwilligers

— **Wico Dieleman**

— Algemeen Coördinator

— Mail : wico.dieleman@zlto.nl


— Mobiel : 06-50.52.84.80

- **Jozien de Winter**

Gebiedscoördinator

Mail : jozien@poldernatuurzeeland.nl

Mobiel: 06-1397 1298



'Poldernatuur Zeeland 'in vogelvlucht'

- 1 Collectief (hele provincie)
- 9 ANV's (9 bestuurders)
 - DB en Ledenraad
- 350 ANLb deelnemers / omzet 2023: 3.8 mln / jaar
- 3 leefgebieden
 - Open Akker
 - Dooradering
 - Open Grasland
- Categorie water (Tholen)



Akkerranden



dijken en landschapselementen



poelen

ANLb deelnemers (laten) tellen !

- Om betrokkenheid en enthousiasme voor ANLb te vergroten
- Tellen hoort bij het agrarisch natuurbeheer ('je kijkt ook naar trips in de uien' 😊)
- Op gestructureerde manier tellen welke vogels er op je beheereenheid voorkomen
- **Zelf, met vrijwilliger of professional inhuren**
- 1 x per 3 jaar moet alles zijn geteld
- Deze beheerperiode nog niet geteld? Dan dit jaar zeker tellen!
- Jaarlijks tellen wordt aanbevolen en geeft beter beeld




Tellingen vinden in 2023 in de volgende periodes plaats

- 3 x in het voorjaar
 - tussen 20 en 30 april
 - tussen 23 en 31 mei
 - tussen 8 en 15 juni
- 2 x in het najaar/winter
 - november/december
 - januari/februari






9 ANV's – elk met eigen 'ANV coördinator – beheermonitoring'





PATRIJS, ± 30 CM



Leefgebied: Kleinschalig agrarisch landschap. Vooral akkers met dijken, struweel en ruigteranden.

Uiterlijk: Hoenderachtige, bruin met grijs gestreept kleed met grijze borst. Keel en gezicht oranjebruin en donkerbruine vlek op buik. Bij man veel groter dan bij vrouw. Tijdens de vlucht valt roodachtige staart op. Kuikens nauwelijks te onderscheiden van fazantkuikens.

Geluid: Mechanisch 'kar-wit', 'kar-wit'.

Gedrag: Standvogel. Leeft buiten broedselzonen in groepen (kluchten) op stoppelvelden en grasachtige overtoeken. Nestelt in ruige vegetatie zoals akkervelden, bermen en in vegetatie onder struwelen en hagen. Man houdt in de buurt van het nest de wacht. Meest actief in de ochtend- en avondschemering. Volwassen patrijzen eten vooral zaden en groene plantendelen, ook wel insecten. De kuikens zijn volledig aangewezen op insecten en zoeken zelf voedsel.

Broedt vanaf eind april t/m juni. 1 legsel met veel eieren (13-16). Eieren worden binnen 23-25 dagen uitgebroed. De jongen stappen meteen het nest uit en zijn na 14 dagen vliegvlug. Na zo'n 5 weken zijn ze zelfstandig.

GELE KWIKSTAART, ± 16 CM



Leefgebied: Open gebied. Akkers, weilanden en vochtige graslanden.

Uiterlijk: Man heeft groen-bruine rug en helder gele buik en borst, grijze kop met witte wenkbrauwstreep. Vrouw is valer gekleurd.

Geluid: Roep is een rijk 'tsiep'

Gedrag: Wipt regelmatig met staart (kwikken) en gebruikt paaltjes en verhogingen (bijv. grondhoop) als uitkijkpost. Eet uitsluitend insecten en overwintert in Afrika. In Nederland tussen april-oktober. Vaak foeragerend tussen vee te vinden. Wordt daarom ook wel 'koelwacht' genoemd. Broedt in goed verborgen grondnest in akker en graslanden.

Broedt vanaf eind april t/m juli. 1 of 2 legfels per jaar. Eieren worden binnen 13 dagen uitgebroed. De jongen blijven 10-13 dagen op het nest en worden gevoerd door ouders met insecten. Daarna kunnen ze binnen enkele dagen goed vliegen.

ZEEUWSE DOELSOORTEN "OPEN AKKER"



PATRIJS
28 CM



GELE KWIKSTAART
16 CM



FAZANTENKOPPEL
VROUW 40CM / MAN 75CM



BUIZERD
55 CM



VELDLEEUWERIK
18 CM



GRASPIEPER



KNEU
13 CM



BRUINE KIEKENDIEF
50 CM

Infobladd akkervogels / Kennis



Beheermonitoring

Hoe tel je?

- Deelnemer voert in op de boerenlandvogelmonitor (of waarneming.nl)
- Ieder heeft inlogcodes ontvangen



Landschappen  NL



welkom bij de

Boerenlandvogelmonitor



Account:


Wachtwoord:

Mobiel: Direct naar mobiel

Login



Beheermonitoring



Najaar – winterperiode

‘samen’ als ANLb deelnemer en vrijwilliger ook ‘terugblikken en leren !



Vragen ?

